

بولتن هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۲۴

صفحه ۱ از ۳

وضعیت جوی ارومیه در چهار روز گذشته

| تاریخ | وضعیت آسمان | | باد (متر بر ثانیه) | | دما (درجه سلسیوس) | | بارش | تبخیر | ساعات | رطوبت (%) | | میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس) | | | | | سایر پدیده های مهم جوی |
|------------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|--------|-----------|--------|-------|-----------|------|--------------------------------------|-------|-------|--------|--|------------------------|
| | سمت | سرعت | سمت | سرعت | کمینه | بیشینه | (میلیمتر) | آفتابی | کمینه | بیشینه | ۵ cm | ۱۰ cm | ۲۰ cm | ۵۰ cm | ۱۰۰ cm | | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۴۰ | ۷ | ۱۱.۵ | ۲۶.۹ | ۰ | ۶.۷ | ۱۱.۳ | ۷۸ | ۳۲ | ۲۱.۷ | ۱۹.۷ | ۱۸.۳ | ۱۵.۲ | ۱۳.۶ | ۷ | | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۷۰ | ۸ | ۱۱.۶ | ۲۸.۴ | ۰ | ۷.۲ | ۸.۶ | ۷۲ | ۲۴ | ۲۰.۸ | ۱۹.۸ | ۱۸.۶ | ۱۵.۶ | ۱۳.۸ | ۷ | | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۷۰ | ۵ | ۱۳ | ۲۳.۳ | ۰ | ۷.۲ | ۶.۴ | ۸۶ | ۲۳ | ۲۰.۶ | ۱۹.۵ | ۱۸.۶ | ۱۶ | ۱۴ | ۸ | | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۶۰ | ۶ | ۱۰.۳ | ۲۲.۸ | ۰.۰۱ | ۵.۶ | ۵.۹ | ۹۳ | ۳۵ | ۱۸.۷ | ۱۸.۳ | ۱۸.۱ | ۱۶.۱ | ۱۴.۲ | ۶ | | |

پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده ارومیه

| تاریخ | وضعیت جوی | | باد (متر بر ثانیه) | | دما (درجه سلسیوس) | | نم نسبی | | سایر پدیده های مهم جوی |
|------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-------------------|-------|---------|---|------------------------|
| | سرعت | سمت | بیشینه | کمینه | بیشینه | کمینه | | | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴-۱۵ | جنوب غربی | ۲۱ | ۹ | ۸۰ | ۳۰ | ۳ | - | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵-۱۵ | جنوب غربی | ۲۰ | ۷ | ۸۵ | ۴۰ | ۱ | - | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴-۱۲ | غربی | ۲۲ | ۹ | ۷۰ | ۳۰ | ۳ | - | |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴-۱۲ | غربی | ۲۶ | ۱۲ | ۷۰ | ۳۵ | ۶ | - | |

| رشته | نوع محصول | مرحله رشد | توصیه |
|----------|-----------|-----------|--|
| زراعت | | | در مزارعی که دچار نگرگ و سرمازدگی شده اند استفاده از محلول پاشی اسید آمینه در مزارع گندم آبی و در مزارع گندم دیم در صورت وجود رطوبت کافی توصیه می گردد - استفاده از اسیدهای آمینه، جلبک و کودهای ریز مغزی در مزارع چغندر قند، کلزا توصیه می گردد. |
| دامپروری | | | تامین علوفه و آب سالم مورد نیاز و تهیه خوراک پرانرژی خودداری از حمل دام غیر مجاز-تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای تنفسی و تغذیه برای گوساله های تازه متولد شده اقدام گردد- تامین مکمل های خوراکی دام و استفاده از ریزمغذیه های استاندارد-با توجه به افزایش دما رعایت بهداشت شیردوشی و انتقال سریع شیر دوشیده شده پس از سرد کردن در حداقل زمان به مراکز جمع آوری شیر-لزوم پاک سازی و ضد عفونی و رعایت امنیت زیستی سالن هابذلیل انتقال بیشتر ویروسهای عامل بیماریهای طیور در زمان وزش باد شدید- واکسیناسیون دام ها و سگ های نگهبان و گله (هاری) طبق برنامه فصلی |

بولتن هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۲۴

صفحه ۲ از ۳

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| <p>تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود رواناب به استخرهای آبرزی پروری -بازدید، پاک سازی و تنظیم دریچه های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به رخداد بارش های رگباری و وزش بادهای شدید- رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها-تهویه مناسب استخرها و هوادهای استخرهای پرورش ماهی- تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی</p> | | | <p>شیلات</p> |
| <p>اجرای شخم بهاره در کف باغات میوه-محلول پاشی با اسید آمینه و جلبک دریایی و کلسیم جهت ترمیم خسارت تگرگ در درختان میوه آسیب دیده -تغذیه باغات میوه براساس آزمایش برگ و خاکی سال قبل-مبارزه با علفهای هرز کف باغات مخصوصا باغات سیب جهت کاهش عارضه زنگار و بیماری لکه سیاه سیب.</p> | | | <p>باغداری</p> |
| <p>بدلیل وزش باد شدید اجتناب از آتش زدن در عرصه های منابع طبیعی.</p> | | | <p>مرتع و آبخیزداری</p> |
| <p>خودداری از تردد بهره برداران در حاشیه مسیل ها، ارتفاعات و نقاط حادثه خیز -خودداری از چرای دام در ارتفاعات و در نزدیکی محل استقرار بدلیل خطر صاعقه - رعایت زمان تردد در مسیر ایل راههای کوچ عشایر-در صورت از بین رفتن دهن و ضدعفونی و سم پاشی محل زندگی خود و جایگاه دام اقدام گردد.</p> | | | <p>عشایر</p> |
| <p>بمنظور حفاظت از کندوهای زنبورعسل در برابر وزش باد و بارندگی ، کندوها پشت به باد و بالاتر از سطح زمین قرار گیرند -دور نگهداشتن کندوها از حاشیه رودخانه ها و مسیل ها با توجه به رخداد بارش های رگباری و احتمال سیلابی شدن مسیل ها-آماده سازی کلنی های زنبور عسل و تغذیه دستی کندوها جهت تحریک ملکه برای تخم ریزی و افزایش جمعیت کندو-انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع کلزا</p> | | | <p>زنبورداری</p> |
| <p>بازبینی تاسیسات و تجهیزات گلخانه ای و در صورت وزش باد شدید روشن کردن فن های خروجی برای جلوگیری از آسیب به پوشش پلاستیکی گلخانه ها.</p> | | | <p>گلخانه</p> |
| <p>مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با انجام شخم عمیق در زمینهای نکاشت- جلوگیری از انباشته شدن کود دامی و بقایای محصولات کشاورزی- تخریب لانه جوندگان ،تله گذاری در انبارها- ثبت نام در سامانه سماک و اخذ QR کد برای محصولات باغی- مبارزه با عوامل خسارت زا در زراعت کلزا و غلات -مبارزه با سن مادری در مزارع غلات -پایش مزارع از نظر بیماریهای برگ بویژه زنگ زرد غلات- مبارزه با لکه سیاه سیب بعد از بارندگی -مبارزه با عوامل خسارت زا در زراعت چغندر- مبارزه با عوامل خسارت زا در زراعت حبوبات و دانه های روغنی -مبارزه با کرم آلو و کرم خوسه خوار انگور مطابق با اطلاعیه های پیش آگاهی (انجام کلیه مبارزات شیمیایی با توجه به پیش بینی های هواشناسی انجام گیرد).</p> | | | <p>حفظ نباتات</p> |
| <p>شرکت خدمات حمایتی: کشاورزان عزیزجهت دریافت کود مورد نیاز کشت بهاره به کارگزاران مجاز در سراسر استان مراجعه نمایند- باتوجه به ذخیره سازی بیش از ۵۵۰۰ تن سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی شرکت کارگزاران محترم نسبت به خرید اقدام نمایند.</p> | | | <p>مرغداری</p> |

بولتن هواشناسی کشاورزی استان آذربایجان غربی

تاریخ جلسه:

۱۴۰۴/۰۲/۲۴

صفحه ۳ از ۳

تسریع در کشت بهاره گلرنگ و کاملینای دیم صورت پذیرد - واکاری مجدد در مزارع چغندر قند خسارت دیده از نگرگ. -
واکسیناسیون دام ها و سگ های نگهبان و گله (هاری) طبق برنامه فصلی . -مبارزه با علفهای هرز کف باغات مخصوصا
باغات سیب جهت کاهش عارضه زنگار و بیماری لکه سیاه سیب -سم پاشی برای مبارزه با سفیدک سطحی در باغات انگور-
هدایت آبهای جاری به انهار آبیاری جهت تغذیه سفره های زیرزمینی.

توصیه کل
استان